

Biopsi

Patientinformation

Formål

Formålet med at tage en biopsi, er at tage et lille stykke hud fra et eller flere elementer, som lægen ønsker en nærmere undersøgelse af for at stille en diagnose.

Udførelse

Efter afvask med en spritserviet foretages injektion af lokalbedøvelse. Lokalbedøvelsen lægges med en meget tynd kanyler omkring det element, der skal tages et lille stykke hud fra. Der kan opstå lidt svie i forbindelse med indsprøjtningen af bedøvelsesvæsken, men herefter skal du ikke kunne mærke noget. Lokalbedøvelsen virker umiddelbart med det samme.

Lægen tager biopsien med en lille rund kniv, hvorefter den sendes til undersøgelse. Herefter kan der være behov for at påføre en væske, der standser blødningen. I de tilfælde, hvor det bløder lidt mere, lægges en lille hæmostatisk bandage under plastret, som ligeledes er med til at standse blødningen.

Efter biopsitagningen

Bedøvelsen aftager i løbet af et par timer, og det er sjældent, at der efterfølgende er smerter forbundet med biopsitagningen.

Biopsitagningen efterlader et sår, der heler op i løbet af 2-4 uger. Vi anbefaler daglig vask med vand og sæbe samt at sætte et nyt plaster på, indtil der er skorpe på såret.

Hold øje med følgende tegn på infektion: **rødme, hævelse, varme, smerte, væske**. Ved tegn på infektion bedes du kontakte klinikken.

Du bør ikke dyrke motion det første døgn efter biopsitagningen.

Ar

Alle operationer i huden, selv fjernelse af små elementer, vil kunne medføre ardannelse. Det bedste kosmetiske resultat opnås ved at beskytte området mod udsættelse for sol det første år.

Nogle mennesker danner såkaldte keloider, dvs. dannelse af større ar end hos andre. Man må derfor nøje overveje vigtigheden af at foretage biopsitagning hos disse personer.