

Tangentiel afskæring/ curettage

Patientinformation

Formål

Formålet med tangentiel afskæring/curettage er at fjerne et mindre element fra huden. Det kan være et modermærke, fredelig hudkræft eller lignende. Metoden er hurtigere og mere overfladisk end udsugning og syning, som udføres ved en operation.

Udførelse

Efter afvask med en spritserviet foretages bedøvelsen, som enten er en injektion af lokalbedøvelse eller en frysebedøvelse med flydende nitrogen. Lokalbedøvelsen lægges med en meget tynd kanyler under og omkring det element, der skal fjernes. Der kan opstå lidt svie i forbindelse med indsprøjtningen af bedøvelsesvæsken, men herefter skal du ikke kunne mærke noget.

Lokalbedøvelsen virker umiddelbart med det samme.

Elementet afskæres eller afskrabes parallelt med hudoverfladen, hvorefter det sendes til undersøgelse. Herefter kan der være behov for at påføre området Ferrichlorid og/eller brændes let med en lille elektrode for at standse blødningen, og området dækkes herefter med et plaster. I de tilfælde, hvor det bløder lidt mere, lægges en lille hæmostatisk bandage under plastret, som ligeledes er med til at standse blødningen.

Efter afskæringen/curettagen

Bedøvelsen aftager i løbet af et par timer, og det er sjældent, at der efterfølgende er smerter forbundet med afskæringen/curettagen.

Afskæringen/curettagen efterlader et sår, der heler op i løbet af 2-4 uger, afhængig af størrelse og lokalisering. Såret kan væske de første par dage op til 1 uge. Vi anbefaler daglig vask med vand og sæbe samt at skifte plaster dagligt, indtil der er skorpe på såret.

Hold øje med følgende tegn på infektion: **rødme, hævelse, varme, smerte, tiltagende gullig væske**. Ved tegn på infektion bedes du kontakte klinikken.

Du bør ikke dyrke motion det første døgn efter afskæringen/curettagen.

Ar

Alle operationer i huden, selv fjernelse af små elementer, vil kunne medføre ardannelse. Det bedste kosmetiske resultat opnås ved at beskytte området mod udsættelse for sol det første år.

Nogle mennesker danner såkaldte keloider, dvs. dannelse af større ar end hos andre. Man må derfor nøje overveje vigtigheden af at foretage afskæringen/curettagen hos disse personer.